

## Инструментальное определение фрустрированных состояний на комплексе «РОФЭС»-Профессионал для профилактики «зависимостей»



**Определяет лиц, с фрустрированными состояниями в результате каких-либо жизненных стрессовых ситуаций с компенсацией, в виде ухода в иррациональные формы защиты, которые могут стать потенциальными потребителями психотропных веществ, наркотиков, алкоголя или иным потребностям, приводящих к зависимостям.**

### Алгоритм теста на комплексе «РОФЭС»

Время тестирования 220 секунд (3 минуты 40 секунд).

Зоны инструментального тестирования – кожные зоны на лучезапястных и голеностопных суставах.

<p><b>1 шаг. Процесс тестирования на комплексе «РОФЭС» - модуль «РОФЭС измерение».</b></p>	<p>По данным инструментального тестирования определяется электрофизиологический паттерн, соответствующий психоэмоциональному состоянию человека в состоянии фрустрации.</p>
<p><b>2 шаг. Оператор запускает «Автоматизированный анализ» полученных данных (Анализ ЭС);</b></p>	<p>Автоматическая обработка Экспертной системой программы «РОФЭС» даёт заключение в разделе «Психология» о текущем психоэмоциональном состоянии тестируемого.</p>
<p><b>3 шаг. Анализ автоматически рассчитанных оценок психоэмоционального состояния</b></p>	<p>На фоне психоэмоциональных состояний, определяющих портрет тестируемого, у него будет вывод: «Признак фрустрированного состояния».</p> <p>В комментарии указано: «Фрустрированное состояние - невозможность реализации своих желаний, потребностей. Как компенсация - может проявляться потребность в иррациональных формах защиты.</p> <p>Рекомендуется внимание специалистов для исключения возникновения "зависимостей".»</p>

	<p>Вывод рассчитывается с коэффициентом математической вероятности от 0 до 1. Актуальным будет являться коэффициент от 0,65 и выше (подсвечивается розовым цветом).</p> <p>Коэффициент от 0,51 до 0,65 характеризует наличие психотравмирующего состояния, ещё не ставшего дестабилизирующим для тестируемого или вытесненного в настоящий момент в подсознание.</p>
<p><b>Дополнительные автоматические оценки, актуализирующие данный вывод, повышающие его вероятность и увеличивающие время прогноза</b></p>	<p>:</p> <p><b>Психозмоциональный статус:</b></p> <p>«Напряжение компенсаторных сил организма (стрессовое, постстрессовое состояние)»</p> <p>«Дистресс – эмоциональное опустошение»</p> <p>«Синдром астении – нервно-психической слабости»</p> <p><b>Адаптационный потенциал:</b></p> <p>меньше 20%</p> <p><b>Функциональное состояние:</b></p> <p>«Требуется восстановление»</p>
<p><b>Дополнительно:</b></p>	<p>:</p> <p><b>Методом нарастания среднего, когда будет наблюдаться повторяемость электрофизиологического портрета «фрустрированное состояние», определяется долгосрочный прогноз, если с тестируемым не будет проводиться коррекционная психофизиологическая работа.</b></p> <p>Например, «Методика профилактики утомлённого состояния и повышения стрессоустойчивости с биологической обратной связью (БОС)» - МОНИКОР. , используемая для восстановления и профилактики «Панических атак».</p> <p>Цикл релаксационных сеансов по 40 - 50 минут, с аффирмациями, направленными на эмоциональную стабилизацию.</p>

Важно, не только выявление лиц, употребляющих наркотические, алкогольные и пр. вещества, ещё важнее своевременно очертить группу лиц, которые могут стать потенциальными потребителями этих веществ в результате каких-либо жизненных стрессовых ситуаций, вызывающих у них состояние фрустрации, с попыткой ухода в иррациональные формы защиты.

.Своевременное выявление "групп риска" позволяет целенаправленно осуществлять профилактику зависимых состояний и в конечном итоге сохранять необходимые кадры.

Все результаты аккумулируются в базе данных за каждым тестируемым.

Методом накопления общего среднего рассчитываются свойства личности, физиологические особенности организма с расчётом «слабого звена» для дальнейших прогнозов психосоматических состояний.

Накопление базы позволяет осуществлять расчёт оценок по психологической совместимости и выведением долгосрочных прогнозов.